

KUTSU, marraskuu 2013

Arvoisa lääkäri

Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi Oy H. Lundbeck Ab:n ja Terveystalo Oulun kanssa yhteistyössä järjestämään kokoukseen.

Aika: Torstai 28.11.2013 klo 16.00 alkaen
Paikka: Scandic Oulu (Saaristonkatu 4, Oulu)

OHJELMA:

Puheenjohtaja: Ilmo Pietarinen, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo Oulu

klo 16.00 Kahvitarjoilu
Yhdistyksen kokous

klo 16.30 Miten toteutuu 30-60-90-malli työterveyshuollossa?
Ilmo Pietarinen, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo Oulu

klo 16.45 Alkoholiriippuvainen työterveyshuollossa – ketä ja mitä hoidan?
Hannu Pentikäinen, alueylilääkäri, Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikkö

Keskustelua

klo 17.30 Selincro® – alkoholinkäyttö hallintaan
Saara Mattila, koulutuspäällikkö, Oy H. Lundbeck Ab

klo 17.45 Buffet -iltapala

klo 20.00 Tilaisuus päättyy

Käytännön järjestelyiden vuoksi pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan perjantaihin 22.11.2013 mennessä osoitteessa: <http://www.lundbeck.com/fi/oulu>
Pyydämme samalla ilmoittamaan mahdollisesta erityisruokavaliosta.

TERVETULOA!

Ystävällisin terveisin

Oy H. Lundbeck Ab Terveystalo Oulu

Saara Mattila Ilmo Pietarinen
koulutuspäällikkö puheenjohtaja



Selincro® (nalmefeeni) 18 mg tabletti pakkauskoot ja hinnat (1.9.2013):

Reseptilääke. Korvattavuus: Ei toistaiseksi. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat (1.9.2013):

VMH (sis alv) 18 mg 7 tabl 40,70 €, 14 tabl 79,34 €, 28 tabl 151,93€, 42 tabl 211,81€.

Selincro 18 mg tabletit, kalvopäällysteiset. Käyttöaiheet: Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen aikuisille alkoholiriippuvaisille potilaille, joiden alkoholinkäyttö aiheuttaa korkean riskin, joilla ei ole fyysisiä vieroitusoireita ja jotka eivät tarvitse välitöntä katkaisuhoidoa. Selincro-hoitoa saa määrätä vain yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Selincro-hoidon saa aloittaa vain potilaille, joiden korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua alkuarviosta. **Annostus ja antotapa:** Aloituskäynnillä arvioidaan potilaan kliininen tila, alkoholiriippuvuus ja alkoholinkäytön määrä. Sen jälkeen potilasta pyydetään kirjaamaan alkoholinkäyttönsä noin kahden viikon ajan. Jos DRL on jatkunut edelleen korkeana tämän kahden viikon jakson aikana, seuraavalla käynnillä voidaan aloittaa Selincro-hoito yhdistettynä psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Hoitovastetta ja tarvetta lääkehoidon jatkamiseen arvioidaan säännöllisesti. Selincron kliinisestä käytöstä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa on tietoa 6–12 kuukauden ajalta. Varovaisuutta on hyvä noudattaa, jos Selincro-hoitoa määrätään yli vuodeksi. Selincroa otetaan tarvittaessa: jokaisena päivänä, jona potilas tuntee olevansa juomisriskissä. Tällöin hänen pitää ottaa yksi tabletti mieluiten 1–2 tuntia ennen arvioimaansa juomisen ajankohtaa. Mikäli potilas on alkanut juoda alkoholia ottamatta Selincro-tablettia, hänen pitää ottaa yksi tabletti mahdollisimman pian. Enimmäisannos on yksi Selincro-tabletti vuorokaudessa. Selincron voi ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Opioidianalgeettien käyttö. Opioidiriippuvuus parhaillaan tai lähimenneisyydessä. Opioidien käytöstä johtuvat akuutit vieroitusoireet. Epäily, että potilas on hiljattain käyttänyt opioideja. Vaikea maksan vajaatoiminta. Vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hiljattain ollut akuutti alkoholin vieroitusoireyhtymä. **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet:** Selincro ei sovi potilaille, joiden hoidon tavoitteena on välitön täysraittius. Alkoholinkäytön vähentämisen tavoitteena on vähitellen raitistuminen. Opioidien käyttö ja muut samanaikaiset sairaudet (psykiatriset sairaudet, kouristuskohtauksia aiheuttavat häiriöt, munuaisten tai maksan vajaatoiminta): katso valmisteyhteenvedo. Selincron määräämisessä 65 vuotta täyttäneille ja Selincron käytössä samanaikaisesti voimakkaan UGT2B7-estäjän kanssa on hyvä noudattaa varovaisuutta. Harvinaista perinnöllistä galaktoosi-intoleranssia, saamelaisilla esiintyvää laktaasinpuutosta tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriötä sairastavat eivät saa ottaa tätä lääkettä. **Yhteisvaikutukset:** Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty in vivo. In vitro -tutkimusten perusteella nalmefeenilla tai sen metaboliiteilla ja muilla samanaikaisesti annetuilla yleisimpien CYP450- ja UGT-entsyymien tai membraanitransporttereiden metaboloimilla lääkkeillä kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Jos Selincroa käytetään samanaikaisesti opioidi-agonistien kanssa, potilas ei välttämättä hyödy opioidi-agonistista. Alkoholin ja Selincron samanaikainen käyttö ei estä alkoholin päihdyttävää vaikutusta. **Fertiliteetti, raskaus ja imetys:** Selincron käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei tiedetä, erittykö nalmefeeni ihmisen rintamaitoon. On päätettävä lopetetaanko imetys vai lopetetaanko tai keskeytetäänkö Selincro-hoito ottaen huomioon imetyksestä aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. **Haittavaikutukset:** Yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, huimaus, unettomuus ja päänsärky. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä tai keskivaikeita ja niitä esiintyi lyhyen aikaa hoidon alussa. ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta, ja terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista (kts. kohta 4.8.). **Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Reseptilääke. Korvattavuus:** Ei toistaiseksi. **Lisätiedot:** Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica. **Kysyttävää?** Selincro-palvelu terveydenhuollon ammattilaisille numerossa 0400 817 001 (ma-pe 9-15).